



โปรแกรมการใส่ปุ๋ยสำหรับมังคุด

ระยะพื้ต้น หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต	แตกใบอ่อนชุดที่ 2, 3	ใบแก่เพสลาด	ติดผลเล็กชุดที่ 3	ระยะสร้างเนื้อ ผลิกลูก
ยารามิรา 16-16-16 จำนวน 25 กก./ไร่ ร่วมกับ ยาราลิว่า ไนโตรเจน 25 กก./ไร่	ยารามิรา 16-16-16 จำนวน 25 กก./ไร่ และใช้ ยาราวิต้า ฟอสฟอรัส อัตรา 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น ทุก 7-10 วัน จนถึงระยะแตกตาดอก หรือใช้ ยาราวิต้า อมาซิงค์ อัตรา 5-10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน	ยารามิรา ปุ๋ยดอกดก จำนวน 25 กก./ไร่	ยารามิรา คอมเพล็กซ์ จำนวน 25 กก./ไร่ ร่วมกับยาราลิว่า ไนโตรเจน 15 กก./ไร่ และใช้ ยาราวิต้า แคลเซียม อัตรา 5-10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น ทุก 7-10 วัน จนถึงก่อนเก็บเกี่ยว	ยารามิรา คอมเพล็กซ์ จำนวน 25 กก./ไร่ ร่วมกับ ยาราลิว่า ไนโตรเจน 25 กก./ไร่

ข้อความสำคัญ ▪ มังคุด 1 ไร่ = 20 ต้น

- โปรแกรมการจัดการธาตุอาหารพืชเป็นแบบการปฏิบัติโดยทั่วไปที่ควรมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของท้องถิ่น เช่น ดิน, ภูมิอากาศ, สายพันธุ์พืช, และวิธีการปลูก
- ควรอ่านฉลากให้ละเอียดทุกครั้งเมื่อใช้ยาราวิต้าร่วมกับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อนักวิชาการเกษตรในพื้นที่ หรือเข้าเว็บไซต์ www.tankmix.com เพื่อตรวจสอบการผสมสาร
- โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายยาราย่อยท่าน หากต้องการข้อมูลการใส่ปุ๋ยยาราย่อยอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัย

ธาตุอาหารเสริมในผลิตภัณฑ์ยารามิรา

- ยารามิรา ปุ๋ยดอกดก 8-24-24 +TE
- ยาราลิว่า ไนโตรเจน 15-0-0 +25.6CaO +0.3B
- ยารามิรา คอมเพล็กซ์ 12-11-18 +TE