



תפוח





โปรแกรมการใส่ปุ๋ยสำหรับหอมแดง



ระยะรองพื้นปลูก



ยารามิรา 15-15-15 จำนวน 50 กก./ไร่



ระยะเร่งการเจริญเติบโต (15-20 วัน)



ยารามิรา 15-9-20 จำนวน 20 กก./ไร่
ร่วมกับ
ยาราลีวา ไนโตรเจน จำนวน 30 กก./ไร่



ขยายหัว เพิ่มน้ำหนัก (25-35 วัน)



ยารามิรา ท็อปเคค 10-10-30 จำนวน 50 กก./ไร่

YaraVita™
ยาราวีต้า



ขอแนะนำกลุ่มผลิตภัณฑ์การใส่ปุ๋ยทางใบและธาตุอาหารเสริมพืช โดยเลือกใช้สูตร อัตรา และระยะเวลาใส่ที่เหมาะสมกับพืช ขอบตามเวลา

หมายเหตุ: ระยะห่างในการใส่ปุ๋ยแต่ละช่วง = 10 วัน
ข้อควรระวัง: โปรแกรมการจัดการธาตุอาหารพืช เป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปที่ควรมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของท้องถิ่น เช่น ดิน, ภูมิอากาศ, สายพันธุ์พืช, และวิธีการปลูก