



โปรแกรมการใส่ปุ๋ยสำหรับแตงโม



รอกันหลุมก่อนปลูก



ยารามิรา 16-16-16 จำนวน 25 กก./ไร่



ระยะเจริญเติบโต (12-15 วัน)



ยารามิรา 16-16-16 จำนวน 25 กก./ไร่
ร่วมกับ ยาราลีวา ไนโตรบอร์ จำนวน 8 กก./ไร่
และใช้ ยาราวีต้า แคลเทร็ก อัตรา 5-10 ซีซี
ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน



ระยะออกดอก (20-24 วัน)



ยารามิรา คอมเพล็กซ์ จำนวน 40 กก./ไร่
ร่วมกับ
ยาราลีวา ไนโตรบอร์ จำนวน 8 กก./ไร่



ระยะบำรุงผล (30-35 วัน)



ยารามิรา คอมเพล็กซ์ จำนวน 40 กก./ไร่
ร่วมกับ ยาราลีวา ไนโตรบอร์ จำนวน 8 กก./ไร่
และใช้ ยาราวีต้า แคลเทร็ก อัตรา 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

ข้อควรสำคัญ ▪ ระยะห่างในการใส่ปุ๋ยแต่ละช่วง = 10 วัน

- โปรแกรมการจัดการธาตุอาหารพืชเป็นแบบวนปฏิบัติโดยทั่วไปที่ควรปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของท้องถิ่น เช่น ดิน, ภูมิอากาศ, สายพันธุ์พืช, และวิธีการปลูก
- ควรอ่านฉลากให้ละเอียดทุกครั้งเมื่อใช้ยาราวีต้าร่วมกับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อนักวิชาการเกษตรในพื้นที่ หรือเข้าเว็บไซต์ www.tankmix.com เพื่อตรวจสอบการผสมสาร
- โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายยารายท้องถิ่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมปุ๋ยยาราย่างทุกวิธีเพื่อความปลอดภัย

ธาตุอาหารเสริมในผลิตภัณฑ์ยาร

- ยาราลีวา ไนโตรบอร์ 15-0-0 +25.6CaO +0.3B
- ยารามิรา คอมเพล็กซ์ 12-11-18 +TE